

BALBUZIE E BILINGUISMO: raccomandazioni e suggerimenti per i logopedisti.

- ◆ Analizzate accuratamente la natura delle disfluenze per determinare se si tratta di balbuzie o se queste derivano dall'eccesso di impegno nello sviluppo linguistico in due lingue che il bambino deve sostenere; iniziate raccogliendo un campione di linguaggio per riuscire a differenziare la balbuzie dalle eventuali normali disfluenze che caratterizzano l'apprendimento della seconda lingua.
- ◆ Comparete la tipologia e la frequenza delle disfluenze tra le due lingue parlate per rilevare se le disfluenze sono presenti in entrambe le lingue. Se un'elevata percentuale di normali disfluenze del parlato sono presenti in una sola lingua, questo potrebbe essere il risultato di una limitata competenza nella lingua piuttosto che trattarsi di balbuzie.
- ◆ Se iniziate un trattamento diretto per la balbuzie, trattate il bambino nella lingua più forte monitorate la lingua più debole per determinare se gli effetti del trattamento perdurano quando la seconda lingua diventa più complessa.



Quando il bambino oppone resistenza nel parlare una seconda lingua, cercate di scoprire la ragione. A volte il bambino ha ricevuto richieste di realizzare obiettivi nella seconda lingua e questa può essere la causa della resistenza. Mai forzare, poiché questo produce una pressione comunicativa sul bambino.

Giornata Europea della Logopedia 6 marzo 2012
"Libera le parole"

BALBUZIE E BILINGUISMO: raccomandazioni e suggerimenti per i logopedisti.

Tradotto e adattato da "The stuttering foundation" a cura di Vecchiuti C. (FLI-Triveneto), Muò R., Ramella B.
(Associazione Logopedisti Piemontesi)

DISTRIBUITO DA FEDERAZIONE LOGOPEDISTI ITALIANI